




性工作者是明智的。
 我们想与你分享灵
 巧对话
 你可以用它来谈论
 安全性行为



"You don't want to catch something during our sexy encounter..."
 "你不会想在我们亲密温纯时感染上什么吧!"

"If I have unsafe oral sex with customers, I might pass it on to you!"
 "如果我给客人做不安全的口交，我可能已经感染性病，并且会传染给你。"

"Rubber really turns me on."
 "安全套让我感觉很放松和性感。"

"I don't do unsafe sex for extra money. I can't put a price on my health or yours."
 "我不会因为你多付钱就做不安全的性行为。你我的健康才是无价的。"

"Darling, the service is for you. The condom is for your lover."
 "亲爱的，我在为你服务安全套在保护你爱的人。"

为什么我们可能做无保护口交


客人可能会要求口交不戴安全套，'natural oral', 'natural French', a 'bareback blow job' (BBBJ) or 'cum in mouth' 或在口中射精 (CIM)。通常客人不知道风险。

每次预订您都有权协商您的服务，保护您的健康，以及您的客人和其他性伴侣的健康。这是你的选择。

客人可能会提供额外的钱，或者它是他们唯一想要的服务。我们可以谈判以保留工作、避免性服务或当客人不能勃起

SWOP鼓励您在谈判前了解情况，并尽量减少风险。

你是一个专业人员，和安全套能在工作中保护你。



Level 1, 110 Botany Rd
 Alexandria NSW 2015

电话: (02) 9184 9466

电邮: swopconnect@swop.org.au

办公时间:

周一/周二/周四/周五上午10点到晚上6点

周三下午2点到6点

www.swop.org.au

感谢我们所工作的土地的传统拥有者



无保护的口交...

你的健康 - 你的决定



性工作者外展计划

无防护的口交

由性工作者提供及为性工作者服务的忠告

自决 • 工作场所权利
 多元化 • 整体健康

为什么
有些人会进行无防
护的口交？

口交不戴
安全套的风险是什
么？



如果您选择没有保护的口交,您可以 通过以下方式将风险降至最低:

如果你嘴唇有破裂、切口、口腔出血、溃疡或喉咙痛避免没有安全套口交,因为这些是进入体内的感染途径。

在提供服务前和他撒尿前检查客人
性健康传播感染症状,并要求他在
服务之前和之后洗涤包皮和撒尿。

穿上安全套和提供全套服务之前洗
手,这样阻止射精前体液和精液在
安全套上。

如果他在你的嘴里射精,需迅速吐
出或吞咽,然后用水冲洗和漱口,
避免在工作之前刷牙或用牙线清洁
牙齿,以及安排非工作日预约牙医

安全套保护你免受性 传播疾病...

你可以从一开始就采取控制

给客人检查性传播感染

他撒尿或淋浴前做一个STI检查。
挤阴茎排出液(白色或黄色),
并寻找红色或瘙痒的皮肤、阴虱、
疮、肿块、水泡或疣。

STI检查后在打开和戴上安全套前洗
手。

管理层应支持的性工作者拒绝接见
可能患有性传播感染,拒绝安全
套或提出健康或安全风险行为的客
人。

如果你不确定怎么对客人进行健康
检查,以寻找可见性传播疾病,拜
访SWOP或到SWOP网站寻找信息:

www.swop.org.au

工作健康与安全 - 您在工作中的安全权

当涉及工作健康和安全(WH&S)
时,没有人应该让你处于危险之
中。

妓院老板和接待员法律上需要支持
工作健康和安全,他们不应该代表
工作者提供无保护服务宣传。

企业应该保护他们提供服务的人的
健康和安全,例如客人。

宣传没有安全套口交,或者代表您
在手机上为客人宣传这项服务,是
违反新南威尔士州工作保障健康和
安全指南的。

这是关于你的健康!

"You're the tenth customer who's
asked me for that today!"

你用愉悦的口气说:"今天你已经
要我无套口交的第十个客人了!"



无保护口交的结果 - 性传播感染

今天多赚的钱可能会导致你以后更多
花费... 休假、医生、护理和客人抱
怨性病。如果你得到治疗,你的客人
可能不会,如果你不使用安全套,他
们可以再次给你性传播感染。

性传播感染可以在你和客人之间传
播,从生殖器、口腔或喉咙在口交没
有安全套。如果你已经有一个性传播
感染病,更容易感染另一个性病

疱疹可以从口腔(唇疱疹)、生殖器
或生殖器入口,即使你看不到任何
伤口。

淋病可以从生殖器到口腔,或口腔到
生殖器。这是相当容易捕捉,特别
是口腔,经常没有症状。

衣原体可以从生殖器到口腔或口腔到
生殖器。

梅毒如果疮存在梅毒可以传染,包括
皮肤与嘴唇、口腔或咽喉皮肤接触。
疮可能是无痛的、小的、容易漏诊。

艾滋病毒由口交传播艾滋病毒的风险
是非常低的,除非口中有疮或切口。

甲肝可以从口腔到肛门接触(舔肛)

生殖器疣(HPV)可以从皮肤到皮肤
接触传播(不是体液),并且可能是
口腔、喉咙和宫颈癌的导致风险。

注:漱口水不会停止性病。

定期进行性病检查,如果你做未受保护的口交,请索要喉咙拭子。